

Un théorème de Rao pour les familles de courbes gauches

Introduction.

On connaît le théorème de Rao pour les courbes localement Cohen-Macaulay et équidimensionnelles de $\mathbf{P}^3$ (espace projectif de dimension 3 sur un corps k algébriquement clos). Rappelons que le module de Rao d'une courbe C est le R -module gradué de longueur finie (avec $R = k[X, Y, Z, T]$) :

$$M_C = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} H^1 \mathcal{I}_C(n).$$

On renvoie à [MDP1] ou [Mi] pour des précisions sur ce module et sur la liaison des courbes gauches. On a alors le théorème de Rao originel (cf. [R1], 1979) :

Théorème de Rao, première forme. *Deux courbes C et C' sont dans la même classe de liaison (resp. de biliaison, ou liaison paire) si et seulement si leurs modules de Rao sont isomorphes ou duaux, à décalage près (resp. isomorphes, à décalage près).*

Rao a énoncé une variante de son théorème (cf. [R2] 1981) que l'on peut formuler plus aisément avec la notion de résolution de type N (resp. E) (cf. [MDP1] II) : si C est une courbe, une telle résolution est une suite exacte de faisceaux sur $\mathbf{P}^3$:

$$0 \rightarrow \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{I}_C \rightarrow 0 \quad (\text{resp.} \quad 0 \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{I}_C \rightarrow 0)$$

où $\mathcal{P}$ et $\mathcal{F}$ sont dissociés (i.e. sommes d'inversibles) et où $\mathcal{N}$ et $\mathcal{E}$ sont des faisceaux localement libres vérifiant $H_*^2 \mathcal{N} = 0$ (resp. $H_*^1 \mathcal{E} = 0$). Ces faisceaux sont bien déterminés à isomorphisme stable près, c'est-à-dire à adjonction de sommes directes d'inversibles près. On a ainsi une application qui à une courbe C associe la classe d'isomorphisme stable du faisceau $\mathcal{N}$ (resp. $\mathcal{E}$) et Rao a montré que cette application est surjective et que ses fibres sont données par le théorème suivant (cf. aussi [N]) :

Théorème de Rao, deuxième forme. *Soient C, C' deux courbes et $\mathcal{N}, \mathcal{N}'$ (resp. $\mathcal{E}, \mathcal{E}'$) les faisceaux intervenant dans une résolution de type N (resp. E) de C et C' . Alors C et C' sont dans la même classe de biliaison si et seulement si $\mathcal{N}$ et $\mathcal{N}'$ (resp. $\mathcal{E}$ et $\mathcal{E}'$) sont stablement isomorphes, à décalage près.*

Il est facile de passer d'une forme à l'autre des théorèmes de Rao. Dans un sens on utilise l'égalité $M_C = H_*^1 \mathcal{N}$ et dans l'autre le fait que $\mathcal{N}$ se retrouve comme faisceau associé à un module de syzygies de la résolution libre de M_C (cf. [MDP1] II). En fait, on voit aisément que le foncteur qui à un faisceau $\mathcal{N}$ (vérifiant $H_*^2 \mathcal{N} = 0$), à isomorphisme stable près, associe $H_*^1 \mathcal{N}$, à isomorphisme près, est une équivalence de catégories (cf. [Ho] 9.1).

Nous allons montrer ici l'analogue du théorème de Rao, deuxième forme, pour les familles (plates) de courbes de $\mathbf{P}^3$ (paramétrées par un anneau noethérien local A).⁽¹⁾ Pour cela nous généralisons les notions de résolutions de type N et E d'une famille $\mathcal{C}$, ce sont des suites exactes comme les suites (1) ci-dessus mais avec comme seule hypothèse le fait que $\mathcal{N}$ et $\mathcal{E}$ sont localement libres sur $\mathbf{P}_A^3$, nous montrons qu'il existe de telles résolutions et que les faisceaux $\mathcal{N}$ et $\mathcal{E}$ sont bien déterminés à **pseudo-isomorphisme** près. Cette notion de pseudo-isomorphisme s'exprime en termes de foncteurs de la catégorie des A -modules dans celle des R_A -modules gradués :

Définition 2.1. Soient $\mathcal{N}$ et $\mathcal{N}'$ des faisceaux cohérents sur $\mathbf{P}_A^3$ et plats sur A et soit f un morphisme de $\mathcal{N}$ dans $\mathcal{N}'$. On dit que f est un *pseudo-isomorphisme* (en abrégé un *psi*) s'il induit :

0) un isomorphisme de foncteurs $H^0(\mathcal{N}(n) \otimes_A \cdot) \rightarrow H^0(\mathcal{N}'(n) \otimes_A \cdot)$ pour tout $n \ll 0$,

1) un isomorphisme de foncteurs $H_*^1(\mathcal{N} \otimes_A \cdot) \rightarrow H_*^1(\mathcal{N}' \otimes_A \cdot)$ et

2) un monomorphisme de foncteurs $H_*^2(\mathcal{N} \otimes_A \cdot) \rightarrow H_*^2(\mathcal{N}' \otimes_A \cdot)$.

Deux faisceaux cohérents seront dits *pseudo-isomorphes* s'il existe une chaîne de *psi* qui les joint.

Cette notion généralise celle d'isomorphisme stable : on montre en effet (cf. 2.4) que $f : \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{N}'$ est un *psi* si et seulement si $\mathcal{N}$ est stablement isomorphe à une extension (pas nécessairement scindée) de $\mathcal{N}'$ par un dissocié. On obtient alors les théorèmes suivants, lorsque le corps résiduel de A est infini :

Théorème 3.1. Soient $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ deux familles plates de courbes paramétrées par l'anneau local A . Alors, $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ sont dans la même classe de biliaison si et seulement si $\mathcal{J}_{\mathcal{C}}$ et $\mathcal{J}_{\mathcal{C}'}$ sont pseudo-isomorphes, à décalage près.

Théorème 3.2. Soient $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ deux familles plates de courbes paramétrées par l'anneau local A , munies de résolutions de type N (resp. E), avec des faisceaux $\mathcal{N}$, $\mathcal{N}'$ (resp. $\mathcal{E}$, $\mathcal{E}'$). Alors, $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ sont dans la même classe de biliaison si et seulement si $\mathcal{N}$ et $\mathcal{N}'$ sont pseudo-isomorphes, à décalage près (resp. si $\mathcal{E}^\vee$ et $\mathcal{E}'^\vee$ sont pseudo-isomorphes, à décalage près).

Pour avoir une variante de ces théorèmes qui ressemble plus à celle de Rao on procède de la manière suivante : on note d'abord que toute classe de faisceaux cohérents pour la relation de pseudo-isomorphisme contient un faisceau $\mathcal{N}$ dit *extraverti* c'est-à-dire vérifiant $\text{Ext}_{R_A}^1(H_*^0 \mathcal{N}, R_A) = 0$.⁽²⁾ De plus ces faisceaux sont uniques dans leur classe, à isomorphisme stable près. Toute famille de courbes admet une résolution de type N extravertie i.e. avec $\mathcal{N}$ extraverti (resp. de type E introvertie i.e. avec $\mathcal{E}^\vee$ extraverti). On a alors :

⁽¹⁾ Dans un travail ultérieur [HMDP3] nous donnerons la variante qui généralise le théorème de Rao première forme et qui nécessite l'introduction d'objets nouveaux : les triades. Dans un autre article [HMDP2] nous construirons des familles de courbes associées aux faisceaux localement libres, c'est-à-dire l'analogue de la surjectivité de l'application $C \mapsto \mathcal{N}$.

⁽²⁾ Cette condition généralise la condition $H_*^2(\mathcal{N}) = 0$, cf. 2.7.

Théorème 3.3. Soient $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ deux familles plates de courbes paramétrées par l'anneau local A , munies de résolutions de type N extraverties (resp. de type E introverties), avec des faisceaux $\mathcal{N}, \mathcal{N}'$ (resp. $\mathcal{E}, \mathcal{E}'$). Alors, $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ sont dans la même classe de biliaison si et seulement si $\mathcal{N}$ et $\mathcal{N}'$ (resp. $\mathcal{E}$ et $\mathcal{E}'$) sont stablement isomorphes à décalage près.

Pour une caractérisation de la liaison impaire, cf. 3.10.

Les résultats établis ici dans le cas des courbes de $\mathbf{P}^3$ se généralisent sans difficulté au cas des sous-schémas de codimension 2 de $\mathbf{P}^n$. On obtient ainsi le théorème suivant (cf. 3.11 pour la définition de pseudo-isomorphisme) :

Théorème 3.13. Soient $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ deux familles plates de sous-schémas de $\mathbf{P}^n$ ($n \geq 3$), de pure codimension 2, sans composantes immergées, paramétrées par l'anneau local A , munies de résolutions de type N (resp. E), avec des faisceaux $\mathcal{N}, \mathcal{N}'$ (resp. $\mathcal{E}, \mathcal{E}'$). Alors, $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ sont dans la même classe de biliaison si et seulement si $\mathcal{N}$ et $\mathcal{N}'$ sont pseudo-isomorphes, à décalage près (resp. si $\mathcal{E}^\vee$ et $\mathcal{E}'^\vee$ sont pseudo-isomorphes, à décalage près).

0. Rappels et notations.

Soit A un anneau noethérien. On pose $T = \text{Spec } A$. On note $\mathbf{P}_A^3$ ou $\mathbf{P}_T^3$ l'espace projectif de dimension 3 sur A et R_A l'anneau $A[X, Y, Z, T]$. Si $\mathcal{F}$ est un faisceau cohérent sur $\mathbf{P}_A^3$ on note $H^i \mathcal{F}$ le A -module $H^i(\mathbf{P}_A^3, \mathcal{F})$ et on pose $H_*^i \mathcal{F} = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} H^i \mathcal{F}(n)$.

Une généralisation de la notion de module libre est celle de R_A -module **dissocié**. Il s'agit des R_A -modules gradués de la forme

$$F = \bigoplus_{i=1}^r M_i \otimes_A R_A(-n_i),$$

où les n_i sont des entiers et les M_i des A -modules projectifs de type fini. Un R_A -module dissocié est projectif sur R_A et même libre si A est local.

De même, on introduit la notion de **faisceau dissocié** sur $\mathbf{P}_A^3$: c'est un faisceau de la forme

$$\mathcal{F} = \bigoplus_{i=1}^r M_i \otimes_A \mathcal{O}_{\mathbf{P}_A^3}(-n_i)$$

où les n_i sont des entiers et les M_i des A -modules projectifs de type fini. Si le module F est dissocié le faisceau associé $\tilde{F}$ l'est aussi ; si le faisceau $\mathcal{F}$ est dissocié le module $H_*^0 \mathcal{F}$ l'est aussi.

Deux faisceaux $\mathcal{F}$ et $\mathcal{F}'$ sur $\mathbf{P}_A^3$ sont dits **stablement isomorphes** s'il existe des faisceaux dissociés $\mathcal{L}$ et $\mathcal{L}'$ et un isomorphisme $\mathcal{F} \oplus \mathcal{L} \simeq \mathcal{F}' \oplus \mathcal{L}'$. Cette relation est une relation d'équivalence.

Sur un corps k , on appelle courbe un sous-schéma de $\mathbf{P}_k^3$ de dimension 1, sans composante ponctuelle (immergée ou non), c'est-à-dire localement de Cohen-Macaulay. On appelle surface un sous-schéma équidimensionnel de dimension 2, donc un diviseur sur $\mathbf{P}_k^3$. Une surface est définie par une unique équation $f \in H^0(\mathbf{P}_k^3, \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(d))$.

Soit T un schéma. On rappelle qu'une famille de courbes gauches $\mathcal{C}$ sur T (on dira simplement une courbe de $\mathbf{P}_T^3$), est un sous-schéma fermé de $\mathbf{P}_T^3$, plat sur T , et dont les fibres sont des courbes au sens précédent. On note $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ le faisceau structural de $\mathcal{C}$ et $\mathcal{J}_{\mathcal{C}}$ le faisceau d'idéaux qui définit $\mathcal{C}$ dans $\mathbf{P}_T^3$.

Une surface de $\mathbf{P}_T^3$ est un sous-schéma fermé X de $\mathbf{P}_T^3$, plat sur T tel que, pour tout $t \in T$, X_t est une surface de $\mathbf{P}_{k(t)}^3$. Si le schéma T est connexe, le degré de X_t est un entier d indépendant de t .

Soit $\mathcal{M}$ un faisceau cohérent sur $\mathbf{P}_T^3$, plat sur T . Rappelons que la dimension projective de $\mathcal{M}$ (notée $\text{dp } \mathcal{M}$) est le plus petit entier n tel qu'il existe une résolution

$$0 \rightarrow \mathcal{P}_n \rightarrow \mathcal{P}_{n-1} \rightarrow \cdots \rightarrow \mathcal{P}_0 \rightarrow \mathcal{M} \rightarrow 0$$

avec les $\mathcal{P}_i$ localement libres. On a alors le résultat suivant :

Proposition 0.1. *Soit A un anneau noethérien, $T = \text{Spec } A$ et soit $\mathcal{M}$ un faisceau cohérent sur $\mathbf{P}_T^3$, plat sur A . Si t est un point de T on pose $\mathcal{M}(t) = \mathcal{M} \otimes_A k(t)$. Soit q un entier ≥ 0 . Les conditions suivantes sont équivalentes :*

- i) $\text{dp } \mathcal{M} \leq q$,
- ii) $\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}}}^i(\mathcal{M}, \mathcal{O}_{\mathbf{P}}) = 0$ pour tout $i > q$,
- iii) pour tout point $t \in T$, $\text{dp } \mathcal{M}(t) \leq q$,
- iv) pour tout point $t \in T$, $\text{prof } \mathcal{M}(t) \geq 3 - q$.

Démonstration. L'équivalence de i) et ii) est standard, celle de i) et de iii) résulte de la platitude de $\mathcal{M}$, enfin, celle de iii) et iv) découle du théorème d'Auslander-Buchsbaum.

Remarques 0.2. Notons deux conséquences de la proposition 0.1 :

- 1) Le faisceau $\mathcal{M}$ est localement libre (i.e. $\text{dp } \mathcal{M} = 0$) si et seulement si on a

$$\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}}}^i(\mathcal{M}, \mathcal{O}_{\mathbf{P}}) = 0 \quad \text{pour tout } i > 0.$$

- 2) En vertu de iv), la condition $\text{dp } \mathcal{M} \leq 2$ est équivalente à la nullité du foncteur $H^0(\mathcal{M}(n) \otimes_A \cdot)$ pour $n \ll 0$. En effet, par dualité (cf. [H] 7.4), cette dernière condition est équivalente à $\text{Ext}_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}}}^3(\mathcal{M}, \omega_{\mathbf{P}}(n) \otimes_A \cdot) = \text{Ext}_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}}}^3(\mathcal{M}, \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(n-4) \otimes_A \cdot) = 0$ pour $n \gg 0$, c'est-à-dire à la nullité du faisceau $\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}}}^3(\mathcal{M}, \mathcal{O}_{\mathbf{P}})$.

- 3) Si $\mathcal{C}$ est une famille de courbes paramétrée par A on a $\text{dp } \mathcal{O}_{\mathcal{C}} = 2$ et $\text{dp } \mathcal{J}_{\mathcal{C}} = 1$.

1. Liaison sur une base.

Soit A un anneau noethérien, $T = \text{Spec } A$. On suppose T connexe. ⁽³⁾

Définition 1.1. *Une courbe $\mathcal{C}$ de $\mathbf{P}_T^3$ est une intersection complète de bidegré (d_1, d_2) si, pour tout $t \in T$, $\mathcal{C}_t$ est une intersection complète de bidegré (d_1, d_2) de $\mathbf{P}_k^3$.*

Attention, sur un anneau quelconque la courbe $\mathcal{C}$ est seulement localement sur T intersection de deux surfaces de $\mathbf{P}_T^3$. Sur un anneau local on a la proposition suivante :

⁽³⁾ Les résultats de ce paragraphe sont valables sur un schéma T localement noethérien.

Proposition 1.2. On suppose $T = \operatorname{Spec} A$ où A est un anneau local noethérien. Soit $\mathcal{C}$ une intersection complète de bidegré (d_1, d_2) de $\mathbf{P}_T^3$. On a une suite exacte :

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{P}_A^3}(-d_1 - d_2) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{P}_A^3}(-d_1) \oplus \mathcal{O}_{\mathbf{P}_A^3}(-d_2) \rightarrow \mathcal{I}_{\mathcal{C}} \rightarrow 0.$$

Définition 1.3. Soit $\mathcal{D}$ une intersection complète de $\mathbf{P}_T^3$ et soient $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ deux courbes de $\mathbf{P}_T^3$ schématiquement contenues dans $\mathcal{D}$. Soit $p_i : \mathcal{O}_{\mathcal{D}} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathcal{C}_i}$ la surjection canonique, qui induit un homomorphisme injectif $\varphi_i : \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}}}(\mathcal{O}_{\mathcal{C}_i}, \mathcal{O}_{\mathcal{D}}) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathcal{D}}$.

On dit que les courbes $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ sont **liées** par $\mathcal{D}$ si, pour $i = 1, 2$ (modulo 2), l'image de φ_i est l'idéal $\mathcal{I}_{\mathcal{C}_{i+1}, \mathcal{D}}$. En particulier on a les isomorphismes :

$$\mathcal{I}_{\mathcal{C}_1, \mathcal{D}} \simeq \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}}}(\mathcal{O}_{\mathcal{C}_2}, \mathcal{O}_{\mathcal{D}}) \quad \text{et} \quad \mathcal{I}_{\mathcal{C}_2, \mathcal{D}} \simeq \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}}}(\mathcal{O}_{\mathcal{C}_1}, \mathcal{O}_{\mathcal{D}}).$$

On dit alors que l'on passe de $\mathcal{C}_1$ à $\mathcal{C}_2$ par une liaison élémentaire.

La proposition suivante est due à Kleppe, cf. [K] 2.4.

Proposition 1.4. Soit $\mathcal{C}$ une courbe de $\mathbf{P}_T^3$ contenue dans une intersection complète $\mathcal{D}$. Soit $\varphi : \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}}}(\mathcal{O}_{\mathcal{C}}, \mathcal{O}_{\mathcal{D}}) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathcal{D}}$ l'homomorphisme canonique associé. Alors l'image de φ est l'idéal $\mathcal{I}_{\mathcal{C}', \mathcal{D}}$ d'une courbe $\mathcal{C}'$ et les courbes $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ sont liées par $\mathcal{D}$.

De plus, la liaison commute aux fibres, i.e., pour tout $t \in T$, les courbes $\mathcal{C}(t)$ et $\mathcal{C}'(t)$ sont liées par $\mathcal{D}(t)$.

Définition 1.5. Soient $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ deux courbes de $\mathbf{P}_T^3$. On dit qu'on passe de $\mathcal{C}_1$ à $\mathcal{C}_2$ par une biliaison élémentaire (d, h) s'il existe une surface $\mathcal{Q}$ de $\mathbf{P}_T^3$ de degré d et un entier h tels que l'on ait $\mathcal{I}_{\mathcal{C}_1, \mathcal{Q}} \simeq \mathcal{I}_{\mathcal{C}_2, \mathcal{Q}}(h)$.

La proposition suivante montre comment construire des biliaisons élémentaires :

Proposition 1.6. Soit $\mathcal{C}$ une courbe de $\mathbf{P}_T^3$ et soient d, h deux entiers, avec $d > 0$. Soit $\mathcal{Q}$ une surface (plate sur A) contenant $\mathcal{C}$ et soit $u : \mathcal{I}_{\mathcal{C}/\mathcal{Q}}(-h) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathcal{Q}}$ un homomorphisme tel que, dans chaque fibre en $t \in T$, $u(t)$ soit injectif et non surjectif. Soit $\mathcal{O}_{\mathcal{C}'}$ le conoyau de u . Alors $\mathcal{C}'$ est une famille (plate) de courbes et u induit un isomorphisme de $\mathcal{I}_{\mathcal{C}/\mathcal{Q}}(-h)$ sur $\mathcal{I}_{\mathcal{C}'/\mathcal{Q}}$, de sorte que $\mathcal{C}'$ est obtenue à partir de $\mathcal{C}$ par une biliaison élémentaire (d, h) .

Si A est local il suffit de vérifier la condition ci-dessus au point fermé.

Si h est ≥ 0 et si A est local on obtient de telles biliaisons élémentaires (dites triviales) en prenant pour u la restriction à $\mathcal{I}_{\mathcal{C}/\mathcal{Q}}$ de la multiplication par un élément $H \in H^0(\mathbf{P}_T^3, \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(h))$, non diviseur de 0 dans la fibre fermée de $\mathcal{Q}$, c'est à dire correspondant à une surface qui coupe proprement $\mathcal{Q}$ dans cette fibre.

Démonstration. Cela résulte de [MDP1] III 2.3 et 2.6 et de [EGA] IV, 11.

Définition 1.7. On dit que $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ sont liées (resp. biliées) si, pour tout $t \in T$, il existe un voisinage ouvert U de t tel que $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ sont jointes par une suite de liaisons

(resp. biliaisons) élémentaires. La relation de liaison (resp. de biliaison) est une relation d'équivalence.

Proposition 1.8. Deux courbes $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ sont biliées si et seulement si elles sont jointes, localement sur T , par une suite formée d'un nombre pair de liaisons élémentaires.

Démonstration. On montre, exactement comme dans [MDP1] III 2.3, qu'une biliaison élémentaire sur la surface $\mathcal{Q}$ est équivalente à deux liaisons élémentaires sur les surfaces $\mathcal{Q}, \mathcal{S}$ et $\mathcal{Q}, \mathcal{S}'$. Il reste à voir que si, partant d'une courbe $\mathcal{C}$, on effectue une liaison sur des surfaces $\mathcal{Q}, \mathcal{S}$ pour obtenir $\mathcal{C}'$ puis une autre sur les surfaces $\mathcal{Q}', \mathcal{S}'$ pour obtenir $\mathcal{C}''$ on peut passer de $\mathcal{C}$ à $\mathcal{C}''$ par des biliaisons élémentaires. Pour cela on choisit une surface $\mathcal{T}$, contenant $\mathcal{C}'$, de degré assez grand pour que $\mathcal{T}$ coupe proprement $\mathcal{Q}$ et $\mathcal{Q}'$ et on effectue successivement les liaisons suivantes :

$$\mathcal{C} \xrightarrow{\mathcal{Q}, \mathcal{S}} \mathcal{C}' \xrightarrow{\mathcal{Q}, \mathcal{T}} \mathcal{C}_0 \xrightarrow{\mathcal{Q}, \mathcal{T}} \mathcal{C}' \xrightarrow{\mathcal{Q}', \mathcal{T}} \mathcal{C}_0' \xrightarrow{\mathcal{Q}', \mathcal{T}} \mathcal{C}' \xrightarrow{\mathcal{Q}', \mathcal{S}'} \mathcal{C}''$$

et on passe ainsi de $\mathcal{C}$ à $\mathcal{C}''$ par trois biliaisons élémentaires sur les surfaces $\mathcal{Q}, \mathcal{T}, \mathcal{Q}'$.

2. Pseudo-isomorphismes et résolutions de type E et N .

a) *Définition des pseudo-isomorphismes.*

Définition 2.1. Soient $\mathcal{N}$ et $\mathcal{N}'$ des faisceaux cohérents sur $\mathbf{P}_A^3$ et plats sur A et soit f un morphisme de $\mathcal{N}$ dans $\mathcal{N}'$. On dit que f est un **pseudo-isomorphisme** (en abrégé un *psi*) s'il induit :

- 0) un isomorphisme de foncteurs $H^0(\mathcal{N}(n) \otimes_A \cdot) \rightarrow H^0(\mathcal{N}'(n) \otimes_A \cdot)$ pour tout $n \ll 0$,
- 1) un isomorphisme de foncteurs $H_*^1(\mathcal{N} \otimes_A \cdot) \rightarrow H_*^1(\mathcal{N}' \otimes_A \cdot)$ et
- 2) un monomorphisme de foncteurs $H_*^2(\mathcal{N} \otimes_A \cdot) \rightarrow H_*^2(\mathcal{N}' \otimes_A \cdot)$.

Deux faisceaux cohérents sur $\mathbf{P}_A^3$ et plats sur A seront dits pseudo-isomorphes s'il existe une chaîne de *psi* qui les joint :

$$\mathcal{N} = \mathcal{N}_0 \rightarrow \mathcal{N}_1 \leftarrow \mathcal{N}_2 \rightarrow \mathcal{N}_3 \leftarrow \cdots \rightarrow \mathcal{N}_{2p-1} \leftarrow \mathcal{N}_{2p} = \mathcal{N}'.$$

Remarques 2.2.

0) La condition 0) de 2.1 est automatiquement vérifiée si les faisceaux $\mathcal{N}$ et $\mathcal{N}'$ sont localement libres, ou si ce sont des faisceaux d'idéaux ou si, plus généralement, on a $\text{dp} \mathcal{N} \leq 2$ et $\text{dp} \mathcal{N}' \leq 2$. Dans tous ces cas en effet $H^0(\mathcal{N}(n) \otimes_A \cdot)$ et $H^0(\mathcal{N}'(n) \otimes_A \cdot)$ sont nuls pour tout $n \ll 0$, cf. 0.2. Dans la suite de cet article nous serons la plupart du temps dans cette situation.

- 1) On peut inverser le sens des flèches dans la chaîne qui joint $\mathcal{N}$ et $\mathcal{N}'$.
- 2) Le composé de deux *psi* en est un autre.
- 3) Si $\mathcal{N}$ est un faisceau cohérent et si $\mathcal{L}$ est dissocié, l'injection canonique $\mathcal{N} \rightarrow \mathcal{N} \oplus \mathcal{L}$ et la projection canonique $\mathcal{N} \oplus \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{N}$ sont des *psi*. Deux faisceaux stablement isomorphes sont pseudo-isomorphes.
- 4) La relation de pseudo-isomorphisme est une relation d'équivalence.

Pour des faisceaux localement libres, on peut caractériser les *psi* par dualité :

Proposition 2.3. Soient $\mathcal{N}$ et $\mathcal{N}'$ des faisceaux localement libres sur $\mathbf{P}_A^3$ et soit f un morphisme de $\mathcal{N}$ dans $\mathcal{N}'$. Alors, f est un *psi* si et seulement si $f^\vee : \mathcal{N}'^\vee \rightarrow \mathcal{N}^\vee$ induit
1') un isomorphisme de foncteurs $H_*^2(\mathcal{N}'^\vee \otimes_A \cdot) \rightarrow H_*^2(\mathcal{N}^\vee \otimes_A \cdot)$ et
2') un épimorphisme de foncteurs $H_*^1(\mathcal{N}'^\vee \otimes_A \cdot) \rightarrow H_*^1(\mathcal{N}^\vee \otimes_A \cdot)$.

Démonstration. Cela résulte de [H] 7.4 et de [AG] III 6.7.

b) *Caractérisation des psi.*

La caractérisation suivante des *psi* est fondamentale :

Proposition 2.4. Soit $f : \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{N}'$ un morphisme de faisceaux cohérents sur $\mathbf{P}_A^3$ et plats sur A . Alors, f est un *psi* si et seulement si il existe un faisceau dissocié $\mathcal{L}$ et un morphisme $p : \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{N}'$ tel que l'on ait une suite exacte

$$0 \rightarrow \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{N} \oplus \mathcal{L} \xrightarrow{(f,p)} \mathcal{N}' \rightarrow 0$$

avec $\mathcal{S}$ dissocié.

Démonstration. Si on a suite exacte comme ci-dessus, il est clair que f est un *psi* (cela résulte du fait que si $\mathcal{L}$ est dissocié on a $H_*^i(\mathcal{L} \otimes \cdot) = 0$ pour $i = 1, 2$ et $H_*^0(\mathcal{L}(n) \otimes \cdot) = 0$ pour $n \ll 0$).

Inversement, supposons que $f : \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{N}'$ est un *psi*. Il existe un entier n_0 tel que, pour $n < n_0$, le morphisme $H^0 \mathcal{N}(n) \rightarrow H^0 \mathcal{N}'(n)$ est un isomorphisme. Comme $\mathcal{N}'$ est cohérent, le module $N' = \bigoplus_{n \geq n_0} H^0 \mathcal{N}'(n)$ est de type fini sur R_A . Soit L un R_A -module libre de type fini avec une surjection $L \rightarrow N'$ qui donne, sur les faisceaux associés un morphisme surjectif $p : \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{N}'$. Soit $\mathcal{S}$ le noyau de $(f, p) : \mathcal{N} \oplus \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{N}'$. Il suffit de montrer que $\mathcal{S}$ est dissocié.

Montrons d'abord que le morphisme de foncteurs $H_*^0((\mathcal{N} \oplus \mathcal{L}) \otimes \cdot) \rightarrow H_*^0(\mathcal{N}' \otimes \cdot)$ est un épimorphisme. Soit Q un A -module que l'on résout par $0 \rightarrow G \rightarrow F \rightarrow Q \rightarrow 0$ avec F libre sur A . On a le diagramme commutatif de suites exactes :

$$\begin{array}{ccccccc} H_*^0((\mathcal{N} \oplus \mathcal{L}) \otimes F) & \rightarrow & H_*^0((\mathcal{N} \oplus \mathcal{L}) \otimes Q) & \rightarrow & H_*^1((\mathcal{N} \oplus \mathcal{L}) \otimes G) & \rightarrow & H_*^1((\mathcal{N} \oplus \mathcal{L}) \otimes F) \\ \downarrow a & & \downarrow b & & \downarrow c & & \downarrow d \\ H_*^0(\mathcal{N}' \otimes F) & \rightarrow & H_*^0(\mathcal{N}' \otimes Q) & \rightarrow & H_*^1(\mathcal{N}' \otimes G) & \rightarrow & H_*^1(\mathcal{N}' \otimes F) \end{array}$$

Comme f est un *psi*, les morphismes c et d sont des isomorphismes. Par ailleurs, comme F est libre, a est surjectif (pour $n < n_0$ parce que $H^0 \mathcal{N}(n) \rightarrow H^0 \mathcal{N}'(n)$ l'est, pour $n \geq n_0$ parce que $H^0 \mathcal{L}(n) \rightarrow H^0 \mathcal{N}'(n)$ l'est). Il en résulte que b est surjectif, comme annoncé.

Alors, le morphisme de foncteurs $H_*^i((\mathcal{L} \oplus \mathcal{N}) \otimes \cdot) \rightarrow H_*^i(\mathcal{N}' \otimes \cdot)$ est un épimorphisme pour $i = 0$, un isomorphisme pour $i = 1$ et un monomorphisme pour $i = 2$ et il en résulte que $H_*^i(\mathcal{S} \otimes \cdot)$ est nul pour $i = 1, 2$. De plus, comme on a $H^0(\mathcal{L}(n) \otimes \cdot) = 0$ pour $n \ll 0$, il résulte de la condition 0) de la définition des *psi* que l'on a $H^0(\mathcal{S}(n) \otimes \cdot) = 0$ pour $n \ll 0$. Cela montre que $\mathcal{S}$ est dissocié en vertu de [H] 7.9.

Remarques 2.5.

1) Une démonstration analogue à celle effectuée ci-dessus montre que dans la définition 2.1 on peut remplacer la condition 0) par le fait que, pour $n \ll 0$, le morphisme $H^0\mathcal{N}(n) \rightarrow H^0\mathcal{N}'(n)$ est un isomorphisme.

2) Soit $f : \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{N}'$ un *psi* de faisceaux cohérents. La caractérisation 2.4 montre que si $\mathcal{N}'$ est localement libre il en est de même de $\mathcal{N}$. En revanche, $\mathcal{N}$ peut être localement libre sans que $\mathcal{N}'$ le soit, cf. 2.18.1. Cependant on a $\text{dp}\mathcal{N} \leq 1 \iff \text{dp}\mathcal{N}' \leq 1$ car ces conditions sont équivalentes à la nullité de $\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}}}^i(\mathcal{N}, \mathcal{O}_{\mathbf{P}})$ pour $i \geq 2$, cf. 0.1.

c) *Faisceaux extravertis.*

Proposition-Définition 2.6. Soit $\mathcal{N}$ un faisceau cohérent sur $\mathbf{P}_A^3$ et plat sur A . Posons $N = H_*^0\mathcal{N}$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- i) $\text{Ext}_{R_A}^1(N, R_A) = 0$,
- ii) $\text{Ext}_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}}}^1(\mathcal{N}, \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(*)) = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} \text{Ext}_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}}}^1(\mathcal{N}, \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(n)) = 0$,
- iii) $H_*^1\mathcal{N}^\vee = 0$ et $\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}}}^1(\mathcal{N}, \mathcal{O}_{\mathbf{P}}) = 0$.

Si on suppose, de plus, qu'on a $\text{dp}\mathcal{N} \leq 1$, ces conditions sont aussi équivalentes à :

- iv) $H_*^1\mathcal{N}^\vee = 0$ et $\mathcal{N}$ localement libre.

Un faisceau $\mathcal{N}$ cohérent sur $\mathbf{P}_A^3$ et plat sur A est dit **extraverti** s'il vérifie les conditions

i) ii) iii) ci-dessus.

Démonstration. Pour montrer l'équivalence de *i* et *ii* il suffit d'établir l'égalité :

$$\text{Ext}_{R_A}^i(N, R_A) = \text{Ext}_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}}}^i(\mathcal{N}, \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(*)) \quad \text{pour } i = 0, 1, 2.$$

Cette relation est claire pour $i = 0$ et on obtient les autres cas par récurrence en utilisant une suite exacte $0 \rightarrow M \rightarrow P \rightarrow N \rightarrow 0$ avec P libre et en tenant compte de l'égalité $\text{Ext}_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}}}^i(\mathcal{P}, \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(*)) = \text{Ext}_{R_A}^i(P, R_A) = 0$ pour $i = 1, 2$.

Pour l'équivalence de *ii* et *iii* on utilise la suite spectrale des Ext dont la suite exacte des termes de bas degré s'écrit :

$$0 \rightarrow H_*^1\mathcal{N}^\vee \rightarrow \text{Ext}_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}}}^1(\mathcal{N}, \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(*)) \rightarrow H_*^0(\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}}}^1(\mathcal{N}, \mathcal{O}_{\mathbf{P}})) \rightarrow H_*^2\mathcal{N}^\vee$$

Il est alors clair que *iii* implique *ii* et que *ii* entraîne la nullité de $H_*^1\mathcal{N}^\vee$. De plus, pour $n \gg 0$, on a $H^i\mathcal{N}^\vee(n) = 0$ pour $i = 1, 2$, donc aussi $H^0(\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}}}^1(\mathcal{N}, \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(n))) = 0$ ce qui implique la nullité du faisceau $\mathcal{E}xt$.

Le cas $\text{dp}\mathcal{N} \leq 1$ résulte de 0.2.1.

Remarque 2.7. La condition $\mathcal{N}$ extraverti généralise la condition usuelle $H_*^2\mathcal{N} = 0$ imposée aux faisceaux (localement libres) des résolutions de type N sur un corps. En effet, si on pose $C = H_*^2(\mathcal{N})$ on a, par dualité, $H_*^1\mathcal{N}^\vee = C^*(4)$ et C est nul si et seulement si C^* l'est, de sorte que la condition donnée est bien équivalente à la nullité de $H_*^2\mathcal{N}$.

Dans le cas des faisceaux extravertis les *psi* ne sont rien d'autres que les isomorphismes stables :

Corollaire 2.8. Soit $f : \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{N}'$ un morphisme de faisceaux cohérents. On suppose $\mathcal{N}'$ extraverti. Alors, f est un psi si et seulement si $\mathcal{N}$ et $\mathcal{N}'$ sont stablement isomorphes via f .

Démonstration. Supposons que f est un psi (l'autre sens est évident avec 2.2.3). En vertu de 2.4 on a une suite exacte $0 \rightarrow \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{N} \oplus \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{N}' \rightarrow 0$ et cette suite est scindée parce que $\text{Ext}_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}}}^1(\mathcal{N}', \mathcal{S}) = 0$ (c'est vrai pour $\mathcal{S} = \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(n)$ puisque $\mathcal{N}'$ est extraverti, donc aussi pour $\mathcal{S}$ dissocié).

Le lemme suivant va permettre de construire des faisceaux extravertis :

Lemme 2.9. Soit M un module de type fini sur R_A . Il existe un module P dissocié, un module de type fini N qui vérifie $\text{Ext}_{R_A}^1(N, R_A) = 0$ et une suite exacte : $0 \rightarrow P \rightarrow N \rightarrow M \rightarrow 0$.

Démonstration. On considère une couverture minimale $P' \rightarrow \text{Ext}_{R_A}^1(M, R_A)$, où P' est un R_A -module libre gradué. La composition des flèches :

$$R_A \rightarrow P' \otimes P'^{\vee} \rightarrow \text{Ext}_{R_A}^1(M, R_A) \otimes P'^{\vee} \rightarrow \text{Ext}_{R_A}^1(M, P'^{\vee})$$

fournit une extension de M par $P'^{\vee}$, donc une suite exacte $0 \rightarrow P'^{\vee} \rightarrow N \rightarrow M \rightarrow 0$. Lorsqu'on la dualise, on obtient un cobord $P' \rightarrow \text{Ext}_{R_A}^1(M, R_A)$ qui est l'homomorphisme dont on est parti, donc qui est surjectif. Autrement dit, on a $\text{Ext}_{R_A}^1(N, R_A) = 0$, et en posant $P = P'^{\vee}$, on a la suite annoncée.

Proposition 2.10.

1) Soit $\mathcal{M}$ un faisceau cohérent sur $\mathbf{P}_A^3$ et plat sur A . Il existe un faisceau extraverti $\mathcal{N}$ et un faisceau dissocié $\mathcal{P}$ et une suite exacte $0 \rightarrow \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{N} \xrightarrow{p} \mathcal{M} \rightarrow 0$, de sorte que p est un psi .

2) Si on suppose $\text{dp } \mathcal{M} \leq 1$ (par exemple si $\mathcal{M}$ est localement libre sur $\mathbf{P}_A^3$ ou si $\mathcal{M} = \mathcal{I}_{\mathcal{C}}$ est le faisceau d'idéaux d'une famille de courbes) le faisceau $\mathcal{N}$ est localement libre.

Démonstration. On considère le R_A -module de type fini $M = \bigoplus_{n \geq 0} H^0 \mathcal{M}(n)$. Le point 1) résulte aussitôt de 2.9 appliqué à M .

Pour le point 2) on note que l'hypothèse $\text{dp } \mathcal{M} \leq 1$ impose $\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}}}^i(\mathcal{M}, \mathcal{O}_{\mathbf{P}}) = 0$ pour $i \geq 2$, donc encore $\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}}}^i(\mathcal{N}, \mathcal{O}_{\mathbf{P}}) = 0$ pour $i \geq 2$. Comme $\mathcal{N}$ est extraverti on a aussi $\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}}}^1(\mathcal{N}, \mathcal{O}_{\mathbf{P}}) = 0$ en vertu de 2.6 et il en résulte que $\mathcal{N}$ est localement libre (cf. 0.2.1).

d) Le lemme de Verdier.

Nous montrons ici un lemme qui permet de réduire la longueur des chaînes de psi à deux. C'est un analogue du calcul de fractions introduit par Verdier dans [V].

Proposition 2.11. (Lemme de Verdier) Soient $\mathcal{N}'$ et $\mathcal{N}''$ des faisceaux cohérents et plats sur A (resp. localement libres sur $\mathbf{P}_A^3$) pseudo-isomorphes. Il existe un faisceau cohérent et plat sur A (resp. localement libre sur $\mathbf{P}_A^3$) $\mathcal{N}$ et des $psi : \mathcal{N}' \leftarrow \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{N}''$. De plus, on peut supposer $\mathcal{N}$ extraverti.

Démonstration. Le résultat provient, par récurrence sur la longueur d'une chaîne de psi joignant les faisceaux, du lemme suivant :

Lemme 2.12. Soient $\mathcal{N}, \mathcal{N}', \mathcal{N}''$ des faisceaux cohérents et plats sur A (resp. localement libres sur $\mathbf{P}_A^3$) avec des *psi* $f' : \mathcal{N}' \rightarrow \mathcal{N}$ et $f'' : \mathcal{N}'' \rightarrow \mathcal{N}$. Il existe un faisceau cohérent plat sur A (resp. localement libre sur $\mathbf{P}_A^3$) $\mathcal{M}$ et des *psi* $g' : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}'$ et $g'' : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}''$.

Démonstration. (du lemme 2.12) Vu la remarque 2.5.2, il suffit de traiter le cas cohérent. Quitte à ajouter à $\mathcal{N}'$ et $\mathcal{N}''$ des faisceaux dissociés on peut supposer qu'on a des suites exactes $0 \rightarrow \mathcal{S}' \rightarrow \mathcal{N}' \rightarrow \mathcal{N} \rightarrow 0$ avec $\mathcal{S}'$ dissocié et l'analogue avec $\mathcal{N}''$. On prend alors pour $\mathcal{M}$ le produit fibré $\mathcal{M} = \mathcal{N}' \times_{\mathcal{N}} \mathcal{N}''$ et on a le diagramme de suites exactes suivant :

$$\begin{array}{ccccccc}
& & 0 & & 0 & & 0 \\
& & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
0 & \rightarrow & \mathcal{S}' & \rightarrow & \mathcal{N}' & \rightarrow & \mathcal{N} \rightarrow 0 \\
& & \downarrow & & \downarrow & & \parallel \\
0 & \rightarrow & \mathcal{M} & \rightarrow & \mathcal{N}' \oplus \mathcal{N}'' & \rightarrow & \mathcal{N} \rightarrow 0 \\
& & \downarrow g'' & & \downarrow & & \downarrow \\
0 & \rightarrow & \mathcal{N}'' & = & \mathcal{N}'' & \rightarrow & 0 \\
& & \downarrow & & \downarrow & & \\
& & 0 & & 0 & &
\end{array}$$

On a ainsi le *psi* g'' cherché et on procède de même pour g' .

L'assertion sur extraverti résulte de 2.10.

Proposition 2.13. Soient $\mathcal{N}$ et $\mathcal{N}'$ des faisceaux extravertis. Alors $\mathcal{N}$ et $\mathcal{N}'$ sont pseudo-isomorphes si et seulement si ils sont stablement isomorphes.

Démonstration. C'est clair avec 2.11, 2.8 et le fait que la relation d'isomorphisme stable est une relation d'équivalence.

Dans le cas d'un anneau local, la structure de la classe d'isomorphisme stable est particulièrement simple :

Proposition 2.14. On suppose A local. La classe de pseudo-isomorphisme d'un faisceau $\mathcal{N}$ cohérent et vérifiant $\text{dp } \mathcal{N} \leq 1$ contient un faisceau $\mathcal{N}_0$ localement libre, extraverti, sans facteur direct dissocié. Tout autre faisceau cohérent extraverti de la classe est de la forme $\mathcal{N}_0 \oplus \mathcal{L}$ où $\mathcal{L}$ est dissocié. Le faisceau $\mathcal{N}_0$ est unique à isomorphisme près.

Démonstration. L'existence est évidente avec 2.10. Si $\mathcal{N}$ est un autre faisceau extraverti de la classe, il est stablement isomorphe à $\mathcal{N}_0$ par 2.13. On montre alors qu'il est de la forme $\mathcal{N}_0 \oplus \mathcal{L}$ en raisonnant comme dans [N] Proposition 2.3. (Dans [N] l'assertion est donnée dans le cas d'un corps, mais on la généralise au cas d'un anneau local en notant que si on a un morphisme surjectif $(f, f') : M \oplus M' \rightarrow A$ de A -modules, alors f ou f' est surjectif). L'unicité en découle aussitôt.

e) Résolutions de type E et N.

Définition 2.15. Soit $\mathcal{C}$ une courbe de $\mathbf{P}_T^3$. Une résolution de type N (resp. E) de $\mathcal{C}$ est une suite exacte de faisceaux sur $\mathbf{P}_T^3$:

$$0 \rightarrow \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{J}_{\mathcal{C}} \rightarrow 0 \quad (\text{resp.} \quad 0 \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{J}_{\mathcal{C}} \rightarrow 0)$$

où $\mathcal{P}$ et $\mathcal{F}$ sont dissociés et où $\mathcal{N}$ et $\mathcal{E}$ sont localement libres.

Définition 2.16. Soient r et r' deux résolutions de type N d'une courbe $\mathcal{C}$. Un morphisme $r \rightarrow r'$ (resp. un isomorphisme) consiste en la donnée de deux morphismes de faisceaux u, v (resp. deux isomorphismes) rendant commutatif le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccccccc} (r) & & 0 & \rightarrow & \mathcal{P} & \rightarrow & \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{J}_{\mathcal{C}} \rightarrow 0 \\ & & & & \downarrow u & & \downarrow v & \parallel \\ & & & & & & & \\ (r') & & 0 & \rightarrow & \mathcal{P}' & \rightarrow & \mathcal{N}' \rightarrow \mathcal{J}_{\mathcal{C}} \rightarrow 0 \end{array}$$

On a évidemment une définition analogue avec les résolutions de type E.

Remarques 2.17.

0) On notera que si on a une résolution $0 \rightarrow \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{J}_{\mathcal{C}} \rightarrow 0$ (resp. $0 \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{J}_{\mathcal{C}} \rightarrow 0$), avec $\mathcal{N}$ (resp. $\mathcal{E}$) cohérent et $\mathcal{P}$ (resp. $\mathcal{F}$) dissocié, alors $\mathcal{N}$ vérifie $\text{dp} \mathcal{N} \leq 1$ (resp. $\mathcal{E}$ est localement libre). Cela résulte de 0.1 et de l'égalité $\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}}}^i(\mathcal{J}_{\mathcal{C}}, \mathcal{O}_{\mathbf{P}}) = 0$ pour $i \geq 2$.

1) Si $0 \rightarrow \mathcal{P} \xrightarrow{u} \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{J}_{\mathcal{C}} \rightarrow 0$ est une résolution de type N et $\mathcal{L}$ un faisceau dissocié quelconque on obtient une autre résolution de type N en prenant :

$$0 \rightarrow \mathcal{P} \oplus \mathcal{L} \xrightarrow{u \oplus \text{Id}} \mathcal{N} \oplus \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{J}_{\mathcal{C}} \rightarrow 0.$$

On a, bien entendu, une assertion analogue pour les résolutions de type E.

2) Soit r une résolution de type N : $0 \rightarrow \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{J}_{\mathcal{C}} \rightarrow 0$ et soit un $f : \mathcal{N}' \rightarrow \mathcal{N}$ un *psi*. En vertu de 2.4, il existe des faisceaux dissociés $\mathcal{S}$ et $\mathcal{L}$ et une suite exacte $0 \rightarrow \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{N}' \oplus \mathcal{L} \xrightarrow{(f, p)} \mathcal{N} \rightarrow 0$. On en déduit une résolution r' de type N : $0 \rightarrow \mathcal{P} \oplus \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{N}' \oplus \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{J}_{\mathcal{C}} \rightarrow 0$ et un morphisme de r' dans r induit par (f, p) .

3) Si on a des résolutions de type N et E de $\mathcal{J}_{\mathcal{C}}$ les faisceaux $\mathcal{N}$ et $\mathcal{E}$ sont reliés, avec les notations de 2.15, par la suite exacte suivante : $0 \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{P} \oplus \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{N} \rightarrow 0$ (passer aux modules et relever la flèche de F dans $I_{\mathcal{C}}$ en une flèche de F dans N).

f) Lien avec les *psi*.

Proposition 2.18.

1) Soit $\mathcal{C}$ une courbe de $\mathbf{P}_A^3$ munie d'une résolution de type N : $0 \rightarrow \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{N} \xrightarrow{p} \mathcal{J}_{\mathcal{C}} \rightarrow 0$. Alors p est un *psi*.

2) Si $\mathcal{C}$ est une courbe de $\mathbf{P}_A^3$ et $\mathcal{Q}$ une surface contenant $\mathcal{C}$, le morphisme $\mathcal{J}_{\mathcal{C}} \rightarrow \mathcal{J}_{\mathcal{C}/\mathcal{Q}}$ est un *psi*.

3) Si on a deux résolutions de type N de $\mathcal{C}$ les faisceaux $\mathcal{N}$ intervenant dans ces résolutions

sont pseudo-isomorphes. Si ces résolutions sont extraverties (cf. 2.22) les faisceaux correspondants sont stablement isomorphes.

Démonstration. Dans les deux cas 1) et 2) cela résulte de 2.4 : c'est clair pour 1) et, pour 2), si $\mathcal{Q}$ est de degré s , on a la suite exacte $0 \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(-s) \rightarrow \mathcal{J}_{\mathcal{C}} \rightarrow \mathcal{J}_{\mathcal{C}/\mathcal{Q}} \rightarrow 0$.

Si on a deux résolutions de type N , les faisceaux $\mathcal{N}$ et $\mathcal{N}'$ sont tous deux pseudo-isomorphes à $\mathcal{J}_{\mathcal{C}}$ en vertu de 2.4, ce qui donne la première assertion de 3). Le cas extraverti résulte de 2.13.

Lorsqu'on a un morphisme de résolutions le résultat suivant précise 2.18.3 et vaut aussi pour les résolutions de type E :

Proposition 2.19. *Soit $\mathcal{C}$ une courbe et $\varphi : r \rightarrow r'$ un morphisme entre deux résolutions de type N (resp. E) de $\mathcal{C}$. Alors le morphisme induit par φ sur les faisceaux $\mathcal{N} \rightarrow \mathcal{N}'$ (resp. $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}'$) est un psi (resp. le dual d'un psi).*

Démonstration. Faisons le pour le cas du type N , l'autre est analogue. Cela résulte du fait que, comme $\mathcal{P}$ est dissocié, donc n'a ni H^1 ni H^2 on a des isomorphismes des foncteurs $H_*^1(\mathcal{N} \otimes \cdot) \simeq H_*^1(\mathcal{J}_{\mathcal{C}} \otimes \cdot) \simeq H_*^1(\mathcal{N}' \otimes \cdot)$ et un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & H_*^2(\mathcal{N} \otimes \cdot) & \rightarrow & H_*^2(\mathcal{J}_{\mathcal{C}} \otimes \cdot) & \rightarrow & \dots \\ & & \downarrow \varphi_2 & & \parallel & & \\ 0 & \rightarrow & H_*^2(\mathcal{N}' \otimes \cdot) & \rightarrow & H_*^2(\mathcal{J}_{\mathcal{C}} \otimes \cdot) & \rightarrow & \dots \end{array}$$

qui montre que φ_2 est un monomorphisme de foncteurs.

g) *Existence des résolutions de type E .*

Proposition 2.20. *Soit $\mathcal{C}$ une courbe de $\mathbf{P}_A^3$. Il existe une résolution r de type E de $\mathcal{C}$. On peut supposer cette résolution introvertie, c'est-à-dire telle que $\mathcal{E}^\vee$ soit extraverti.*

Démonstration. On considère $I_{\mathcal{C}} = H_*^0 \mathcal{J}_{\mathcal{C}}$. Soit F un R_A -module libre avec $p : F \rightarrow I_{\mathcal{C}}$ surjectif et soit E le noyau de p . Alors la suite de faisceaux associés $0 \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{J}_{\mathcal{C}} \rightarrow 0$ est une résolution de type E introvertie.

En effet, comme $\mathcal{J}_{\mathcal{C}}$ est plat sur A il en est de même de $\mathcal{E}$. De plus, dans chaque fibre en $t \in T$, $\mathcal{E}(t)$ est localement libre, donc $\mathcal{E}$ est localement libre. Par ailleurs, $\mathcal{E}^\vee$ est extraverti car p est surjective.

Proposition 2.21. *(Domination) Soient r_1 et r_2 deux résolutions de type E de $\mathcal{C}$. Il existe une résolution r de type E introvertie avec des morphismes $r_1 \rightarrow r$ et $r_2 \rightarrow r$. Les faisceaux $\mathcal{E}_1^\vee$ et $\mathcal{E}_2^\vee$ correspondants sont pseudo-isomorphes. Si ces résolutions sont introverties les faisceaux $\mathcal{E}_1$ et $\mathcal{E}_2$ sont stablement isomorphes.*

Démonstration. Posons, pour $k = 1, 2$, $(r_k) = (0 \rightarrow \mathcal{E}_k \rightarrow \mathcal{F}_k \rightarrow \mathcal{J}_{\mathcal{C}} \rightarrow 0)$ et soit I_k l'image du module libre F_k dans $H_*^0 \mathcal{J}_{\mathcal{C}}$ de sorte que I_1 et I_2 sont contenus dans $I_{\mathcal{C}}$. Si on prend un module libre F avec une suite exacte $0 \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow I_{\mathcal{C}} \rightarrow 0$ on vérifie aussitôt que les inclusions des I_k dans $I_{\mathcal{C}}$ se relèvent aux suites $0 \rightarrow E_k \rightarrow F_k \rightarrow I_k \rightarrow 0$ et fournissent les morphismes souhaités.

En vertu de 2.19 les faisceaux $\mathcal{E}_1$ et $\mathcal{E}_2$ sont pseudo-isomorphes. Le cas introverti découle de 2.13.

h) *Existence de résolutions de type N.*

Proposition 2.22. Soit $\mathcal{C}$ une courbe de $\mathbf{P}_A^3$. Il existe une résolution de type N de $\mathcal{C}$. On peut supposer cette résolution extravertie c'est-à-dire telle que $\mathcal{N}$ soit extraverti.

Démonstration. Comme le faisceau $\mathcal{I}_{\mathcal{C}}$ est plat sur A et vérifie $\mathrm{dp} \mathcal{I}_{\mathcal{C}} \leq 1$, cela résulte de 2.10.2.

Proposition 2.23. (domination) Soient r_1 et r_2 deux résolutions de type N de $\mathcal{C}$. Il existe une résolution r de type N extravertie avec des morphismes $r \rightarrow r_1$ et $r \rightarrow r_2$.

Démonstration. En utilisant 2.11 et les remarques 2.17.1 et 2.17.2 on se ramène au cas où les deux résolutions sont extraverties avec le même $\mathcal{N}$ et il s'agit de montrer qu'il y a un morphisme de l'une dans l'autre. Comme on a $\mathrm{Ext}_{R_A}^1(N, R_A) = 0$, donc aussi $\mathrm{Ext}_{R_A}^1(N, P) = 0$, puisque P est dissocié, l'identité de $I_{\mathcal{C}} = H_*^0 \mathcal{I}_{\mathcal{C}}$ se relève en une flèche de N dans N qui donne le morphisme cherché.

i) *Comportement des résolutions par liaison.*

Si $\mathcal{C}$ est une courbe de $\mathbf{P}_T^3$, le faisceau dualisant relatif de $\mathcal{C}$ sur T est, par définition :

$$\omega_{\mathcal{C}/T} = \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}_T}}^2(\mathcal{O}_{\mathcal{C}}, \mathcal{O}_{\mathbf{P}_T}(-4))$$

et on a les résultats suivants (cf. [S], 3.2 et 3.3, voir aussi [BPS] et [JS]) :

$$1) \quad \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}_T}}^i(\omega_{\mathcal{C}/T}, \mathcal{O}_{\mathbf{P}_T}) = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq 2, \\ \mathcal{O}_{\mathcal{C}}(4) & \text{si } i = 2. \end{cases}$$

$$2) \quad \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}_T}}^i(\mathcal{O}_{\mathcal{C}}, \mathcal{O}_{\mathbf{P}_T}) = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq 2, \\ \omega_{\mathcal{C}/T}(4) & \text{si } i = 2. \end{cases}$$

Soit $\mathcal{C}_1$ une courbe de $\mathbf{P}_A^3$, contenue dans une intersection complète $\mathcal{D}$, de bidegré (s, t) . On suppose qu'on a une résolution de $\mathcal{D}$ comme en 1.2 (c'est le cas, par exemple, si A est local) :

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(-s-t) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(-s) \oplus \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(-t) \rightarrow \mathcal{I}_{\mathcal{D}} \rightarrow 0.$$

Soit $\mathcal{C}_2$ la courbe liée à $\mathcal{C}_1$ par $\mathcal{D}$ (cf. 1.4). Les deux propositions suivantes comparent les résolutions de $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$:

Proposition 2.24. Soit $0 \rightarrow \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{I}_{\mathcal{C}_1} \rightarrow 0$ une résolution de type N de $\mathcal{C}_1$. On a une résolution de type E de $\mathcal{C}_2$:

$$0 \rightarrow \mathcal{N}^{\vee}(-s-t) \rightarrow \mathcal{P}^{\vee}(-s-t) \oplus \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(-s) \oplus \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(-t) \rightarrow \mathcal{I}_{\mathcal{C}_2} \rightarrow 0.$$

Démonstration. La méthode est classique, cf. [PS] 2.5. Comme la flèche $H_*^0 \mathcal{N} \rightarrow H_*^0 \mathcal{J}_{\mathcal{C}_1}$ est surjective, l'inclusion $\mathcal{J}_{\mathcal{D}} \subset \mathcal{J}_{\mathcal{C}_1}$ se relève en un morphisme des résolutions. En dualisant ce morphisme on obtient le morphisme de complexes suivant (en degrés 1 et 0) :

$$\begin{array}{ccc} (L.) & \mathcal{N}^\vee & \rightarrow \mathcal{P}^\vee \\ & \downarrow & \downarrow \\ (M.) & \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(s) \oplus \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(t) & \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(s+t) \end{array}$$

Les groupes d'homologie en degré 1 sont tous deux isomorphes à $\mathcal{O}_{\mathbf{P}}$ et en degré 0 on trouve respectivement $h_0 L_\bullet = \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}}}^1(\mathcal{J}_{\mathcal{C}_1}, \mathcal{O}_{\mathbf{P}}) \simeq \omega_{\mathcal{C}_1/T}(4)$ et $h_0 M_\bullet = \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}}}^1(\mathcal{J}_{\mathcal{D}}, \mathcal{O}_{\mathbf{P}}) = \omega_{\mathcal{D}/T}(4)$ en vertu du rappel.

On considère la suite exacte $0 \rightarrow \mathcal{J}_{\mathcal{D}} \rightarrow \mathcal{J}_{\mathcal{C}_1} \rightarrow \mathcal{J}_{\mathcal{C}_1, \mathcal{D}} \rightarrow 0$. La définition de la liaison donne un isomorphisme : $\mathcal{J}_{\mathcal{C}_1, \mathcal{D}} \simeq \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}}}(\mathcal{O}_{\mathcal{C}_2}, \mathcal{O}_{\mathcal{D}})$ et, vu la résolution de $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$, ce faisceau est encore isomorphe à $\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}}}^2(\mathcal{O}_{\mathcal{C}_2}, \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(-s-t)) = \omega_{\mathcal{C}_2/T}(4-s-t)$. On a donc la suite exacte

$$0 \rightarrow \mathcal{J}_{\mathcal{D}} \rightarrow \mathcal{J}_{\mathcal{C}_1} \rightarrow \omega_{\mathcal{C}_2/T}(4-s-t) \rightarrow 0$$

qui, par dualité donne

$$0 \rightarrow \omega_{\mathcal{C}_1/T}(4) \rightarrow \omega_{\mathcal{D}/T}(4) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathcal{C}_2}(s+t) \rightarrow 0$$

en vertu des résultats de Schlesinger.

On considère alors le cône $C_\bullet$ du morphisme $L_\bullet \rightarrow M_\bullet$:

$$(C.) \quad \mathcal{N}^\vee \rightarrow \mathcal{P}^\vee \oplus \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(s) \oplus \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(t) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(s+t).$$

On a $h^i C_\bullet = 0$ pour $i \geq 1$ et la suite exacte d'homologie : $0 \rightarrow h_0 L_\bullet \rightarrow h_0 M_\bullet \rightarrow h_0 C_\bullet \rightarrow 0$ montre qu'on a $h_0 C_\bullet = \mathcal{O}_{\mathcal{C}_2}(s+t)$, d'où la suite exacte

$$0 \rightarrow \mathcal{N}^\vee \rightarrow \mathcal{P}^\vee \oplus \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(s) \oplus \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(t) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(s+t) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathcal{C}_2}(s+t) \rightarrow 0$$

et la conclusion s'ensuit.

Proposition 2.25. *Soit $0 \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{J}_{\mathcal{C}_1} \rightarrow 0$ une résolution de type E de $\mathcal{C}_1$. On suppose que le morphisme composé $\mathcal{O}_{\mathbf{P}}(-s) \oplus \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(-t) \rightarrow \mathcal{J}_{\mathcal{D}} \subset \mathcal{J}_{\mathcal{C}_1}$ se relève à $\mathcal{F}$. Alors on a une résolution de type N de $\mathcal{C}_2$:*

$$0 \rightarrow \mathcal{F}^\vee(-s-t) \rightarrow \mathcal{E}^\vee(-s-t) \oplus \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(-s) \oplus \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(-t) \rightarrow \mathcal{J}_{\mathcal{C}_2} \rightarrow 0.$$

Démonstration. L'existence du relèvement étant assurée, la démonstration est identique à la précédente.

Remarques 2.26.

- 1) L'hypothèse de l'existence d'un relèvement dans 2.25 est vérifiée si le faisceau $\mathcal{E}$ vérifie $H_*^1 \mathcal{E} = 0$, ou si on prend $s, t > n_0$ où n_0 est le plus petit entier au-delà duquel on a $H^1 \mathcal{E}(n) = 0$.
- 2) On peut utiliser 2.25 pour donner des variantes de l'existence des résolutions de type N.
- 3) Il résulte de 2.25 et 2.26 et de 1.8 que, par biliaison, les faisceaux $\mathcal{E}$ et $\mathcal{N}$ sont invariants, à adjonction d'un faisceau dissocié près.

3. Le théorème de Rao.*a) Énoncés.*

Dans ce paragraphe on suppose l'anneau A **local** noethérien et on note m_A son radical. Soient t le point fermé de $T = \text{Spec } A$ et $k(t)$ le corps résiduel, qui sera supposé **infini**.

Soient H un A -module de type fini, $\overline{H} = H \otimes_A k(t)$ le $k(t)$ -espace vectoriel de dimension finie obtenu par réduction modulo m_A et $\pi : H \rightarrow \overline{H}$ la projection canonique. Nous dirons qu'une propriété P des éléments de H est vraie pour h "général" dans H s'il existe un ouvert de Zariski non vide $\overline{U}$ du schéma affine associé à $\overline{H}$ tel que P soit vraie pour tout $h \in \pi^{-1}(\overline{U})$. Puisque $k(t)$ est infini, un tel ouvert a des points rationnels, et son image réciproque $\pi^{-1}(\overline{U})$, considérée comme sous-ensemble du A -module H , n'est pas vide.

Nous donnons trois variantes du théorème de Rao.

Théorème 3.1. *Soient $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ deux familles plates de courbes paramétrées par A . Alors, $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ sont dans la même classe de biliaison si et seulement si $\mathcal{J}_{\mathcal{C}}$ et $\mathcal{J}_{\mathcal{C}'}$ sont pseudo-isomorphes, à décalage près (i.e., il existe un entier h tel que $\mathcal{J}_{\mathcal{C}}$ et $\mathcal{J}_{\mathcal{C}'}(h)$ sont pseudo-isomorphes).*

Théorème 3.2. *Soient $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ deux familles plates de courbes paramétrées par A , munies de résolutions de type N (resp. E), avec des faisceaux $\mathcal{N}, \mathcal{N}'$ (resp. $\mathcal{E}, \mathcal{E}'$). Alors, $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ sont dans la même classe de biliaison si et seulement si $\mathcal{N}$ et $\mathcal{N}'$ sont pseudo-isomorphes à décalage près (resp. si $\mathcal{E}^\vee$ et $\mathcal{E}'^\vee$ sont pseudo-isomorphes à décalage près).*

Théorème 3.3. *Soient $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ deux familles plates de courbes paramétrées par A , munies de résolutions de type N extraverties (resp. de type E introverties), avec des faisceaux $\mathcal{N}, \mathcal{N}'$ (resp. $\mathcal{E}, \mathcal{E}'$). Alors, $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ sont dans la même classe de biliaison si et seulement si $\mathcal{N}$ et $\mathcal{N}'$ (resp. si $\mathcal{E}$ et $\mathcal{E}'$) sont stablement isomorphes à décalage près.*

b) Démonstration : condition nécessaire.

On suppose $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ dans la même classe de biliaison.

Vu les définitions de la biliaison et des *psi*, on peut supposer qu'on passe de $\mathcal{C}$ à $\mathcal{C}'$ par une biliaison élémentaire. On a alors une surface $\mathcal{Q}$ contenant $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ et un entier h tels que l'on ait un isomorphisme $\mathcal{J}_{\mathcal{C}/\mathcal{Q}} \simeq \mathcal{J}_{\mathcal{C}'/\mathcal{Q}}(h)$, de sorte que ces faisceaux sont pseudo-isomorphes. On en déduit que $\mathcal{J}_{\mathcal{C}}$ et $\mathcal{J}_{\mathcal{C}'}(h)$ le sont aussi par 2.18.2, d'où le sens direct de 3.1. On en déduit aussi, par 2.18.1, que les faisceaux $\mathcal{N}$ et $\mathcal{N}'(h)$ de résolutions de type N de $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ sont pseudo-isomorphes, d'où 3.2 pour le type N et 3.3 pour le type E extraverti résulte alors de 2.13. Pour les assertions sur les résolutions de type E on lie

$\mathcal{C}$ (resp. $\mathcal{C}'$) à $\mathcal{C}_1$ (resp. $\mathcal{C}'_1$) et on applique ce qui précède à ces courbes en utilisant 1.8 et 2.25.

c) *Démonstration : condition suffisante.*

Notons déjà que, quitte à faire deux liaisons comme ci-dessus, on peut se contenter de montrer 3.3 (ou 3.2) dans le cas des résolutions de type N . On en déduira alors 3.1 grâce à 2.18.

On va montrer la proposition suivante :

Proposition 3.4. *Soient $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ deux courbes de $\mathbf{P}_A^3$ admettant les résolutions de type N (ou de type N décalée) suivantes :*

$$0 \rightarrow \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{I}_{\mathcal{C}} \rightarrow 0 \quad \text{et} \quad 0 \rightarrow \mathcal{P}' \rightarrow \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{I}_{\mathcal{C}'}(h) \rightarrow 0$$

où h est un entier et où le faisceau $\mathcal{N}$ est le même pour les deux résolutions. Alors, $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ sont dans la même classe de biliaison.

Il est clair que cette proposition implique la condition suffisante dans 3.3 ou 3.2. En effet, si on a des résolutions de type N extraverties de $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ avec $\mathcal{N}$ et $\mathcal{N}'$ stablement isomorphes à décalage près on obtient des résolutions de type N avec le même $\mathcal{N}$ comme en 3.4 en ajoutant des dissociés, cf. remarque 2.17.1.

d) *Démonstration de 3.4.*

En passant aux sections globales on a les suites exactes de modules déduites des résolutions ci-dessus :

$$0 \rightarrow P \xrightarrow{\varphi} N \xrightarrow{p} I_{\mathcal{C}} \rightarrow 0 \quad \text{et} \quad 0 \rightarrow P' \xrightarrow{\varphi'} N \xrightarrow{p'} I_{\mathcal{C}'}(h) \rightarrow 0,$$

que l'on peut récrire sous la forme :

$$0 \rightarrow P \oplus P' \xrightarrow{\psi} N \oplus P' \xrightarrow{(p, -p\varphi')} I_{\mathcal{C}} \rightarrow 0 \quad \text{et} \quad 0 \rightarrow P \oplus P' \xrightarrow{\psi'} N \oplus P' \xrightarrow{(p', -p'\varphi')} I_{\mathcal{C}'}(h) \rightarrow 0$$

$$\text{avec} \quad \psi = \begin{pmatrix} \varphi & \varphi' \\ 0 & \text{Id}_{P'} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \psi' = \begin{pmatrix} \varphi & \varphi' \\ \text{Id}_P & 0 \end{pmatrix}$$

ce qui nous ramène à montrer la proposition suivante :

Proposition 3.5. *Soient $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ deux familles de courbes avec des résolutions de la forme :*

$$0 \rightarrow P \xrightarrow{^t(\varphi \ \alpha)} N \oplus L \xrightarrow{p} I_{\mathcal{C}}(h) \rightarrow 0 \quad \text{et} \quad 0 \rightarrow P \xrightarrow{^t(\varphi \ \alpha')} N \oplus L' \xrightarrow{p'} I_{\mathcal{C}'}(h') \rightarrow 0$$

où P, L, L' sont libres sur R_A , où le faisceau associé à N est localement libre et où la flèche $\varphi : P \rightarrow N$ est la même pour les deux suites. Alors, on passe de $\mathcal{C}$ à $\mathcal{C}'$ par un nombre fini de biliaisons élémentaires.

Démonstration. (de 3.5) Elle procède par récurrence sur $\text{rang } L = \text{rang } L'$ et nécessite plusieurs lemmes. Dans tous ces lemmes les hypothèses sur les modules P et N seront celles de 3.5 : P est libre sur R_A et le faisceau associé à N est localement libre sur $\mathbf{P}_A^3$.

Si s est une section d'un faisceau $\mathcal{F}$ sur $\mathbf{P}_A^3$ on note $\bar{s}$ l'image de s dans $\mathcal{F} \otimes_A k(t)$. On pose $R = R_A \otimes_A k(t)$.

Rappelons, cf. 1.6, que si on a une courbe $\mathcal{C}$ contenue dans une surface $\mathcal{Q}$ d'équation Q , plate sur A , un entier $h \geq 0$ et un élément $H \in H^0(\mathbf{P}^3, \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(h))$ tel que la multiplication par H , $u_H : \mathcal{O}_{\mathcal{Q}}(-h) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathcal{Q}}$, soit injective dans la fibre fermée, on obtient une courbe $\mathcal{C}'$, avec une biliaison élémentaire triviale de $\mathcal{C}$ à $\mathcal{C}'$, en prenant pour $\mathcal{O}_{\mathcal{C}'}$ le conoyau de u_H et qu'alors l'idéal de $\mathcal{C}'$ est $HI_{\mathcal{C}} + (Q)$. La traduction de ce résultat est le lemme suivant :

Lemme 3.6. *Soit $\mathcal{C}$ une famille de courbes admettant une résolution :*

$$0 \rightarrow P \xrightarrow{\varphi} N \xrightarrow{p} I_{\mathcal{C}} \rightarrow 0.$$

Soient a et h des entiers avec $a > 0$ et $h \geq 0$ et soit $Q \in H^0(\mathbf{P}_A^3, \mathcal{I}_{\mathcal{C}}(a))$ tel que $\bar{Q} \neq 0$. Alors la famille de surfaces $\mathcal{Q}$ définie par Q est plate sur A et il existe $H \in H^0(\mathbf{P}_A^3, \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(h)) = R_{A,h}$ tel que $\bar{H}$ et $\bar{Q}$ soient sans facteur commun dans R . L'élément H permet de faire une biliaison élémentaire triviale de hauteur h sur $\mathcal{Q}$ et on obtient une famille de courbes $\mathcal{C}'$ qui a une résolution :

$$0 \rightarrow P \oplus R_A(-a) \xrightarrow{\psi} N \oplus R_A(h-a) \xrightarrow{(H_p, Q)} I_{\mathcal{C}'}(h) \rightarrow 0$$

avec $\psi = \begin{pmatrix} \varphi & f \\ 0 & -H \end{pmatrix}$ où f vérifie $p(f) = Q$.

Démonstration. Puisque $\bar{Q}$ est non nul, Q n'est pas diviseur de 0 dans R_A et la famille de surfaces définie par Q est plate sur A . Il est clair qu'on peut trouver un H convenable. Puisque $\bar{H}$ et $\bar{Q}$ n'ont pas de facteur commun, la multiplication par $H : \mathcal{O}_{\mathcal{Q}}(-h) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathcal{Q}}$ est injective dans la fibre fermée. On peut donc faire une biliaison élémentaire triviale et on obtient une famille de courbes $\mathcal{C}'$ telle que $I_{\mathcal{C}'} = HI_{\mathcal{C}} + (Q)$. On écrit alors $Q = p(f)$ avec $f \in N_a$ et on vérifie que $I_{\mathcal{C}'}$ a la résolution annoncée.

Le lemme suivant est le cas particulier de 3.5 où l'on suppose L et L' de rang 1 et $\det \varphi$ non nul au point fermé.

Lemme 3.7. *Soient $\mathcal{C}, \mathcal{C}'$ des familles de courbes avec des résolutions de la forme :*

$$0 \rightarrow P \xrightarrow{^t(\varphi \ \alpha)} N \oplus R_A(-a) \xrightarrow{p} I_{\mathcal{C}} \rightarrow 0,$$

$$0 \rightarrow P \xrightarrow{^t(\varphi \ \alpha')} N \oplus R_A(-a') \xrightarrow{p'} I_{\mathcal{C}'}(a-a') \rightarrow 0$$

avec $a' \leq a$. Soit $Q \in R_A$ un déterminant de φ (Q est un élément homogène de degré a de R_A , défini à un élément inversible de A près). On a les propriétés suivantes :

- 1) Les flèches p et p' sont de la forme $p = (\sigma \ Q)$ et $p' = (\sigma' \ Q)$.
- 2) Si, de plus, on a $\bar{Q} \neq 0$, on passe de $\mathcal{C}$ à $\mathcal{C}'$ par un nombre fini de biliaisons élémentaires.

Démonstration. 1) En vertu du théorème de Hilbert-Burch les flèches p et p' sont données localement par les mineurs de $^t(\varphi \ \alpha)$ et $^t(\varphi \ \alpha')$, donc sont de la forme annoncée.

2) Supposons d'abord qu'on a $a' = a$. Puisque $\overline{Q}$ est non nul, la famille de surfaces $\mathcal{Q}$ définie par Q est plate sur A . Les idéaux $I_{\mathcal{C}/\mathcal{Q}}$ et $I_{\mathcal{C}'/\mathcal{Q}}$ ont alors tous deux une résolution de la forme

$$0 \rightarrow P \xrightarrow{\varphi} N \rightarrow I_{\mathcal{C}/\mathcal{Q}} \rightarrow 0,$$

donc sont tous deux isomorphes à $\text{Coker } \varphi$ et on a un isomorphisme $u : I_{\mathcal{C}/\mathcal{Q}} \rightarrow I_{\mathcal{C}'/\mathcal{Q}}$ c'est-à-dire encore une biliaison élémentaire de hauteur 0 qui passe de $\mathcal{C}$ à $\mathcal{C}'$.

Si a' est $< a$ on prend $H \in H^0(\mathbf{P}_A^3, \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(a - a'))$ tel que $\overline{H}$ et $\overline{Q}$ soient sans facteur commun et on effectue la biliaison élémentaire triviale de hauteur $h = a - a'$ définie par Q et H (cf. 3.6). On obtient une courbe $\mathcal{C}_1$ avec la résolution donnée par 3.6 :

$$0 \rightarrow P \oplus R_A(-a) \xrightarrow{\psi} N \oplus R_A(-a) \oplus R_A(-a') \rightarrow I_{\mathcal{C}_1}(a - a') \rightarrow 0$$

avec $\psi = \begin{pmatrix} \varphi & 0 \\ \alpha & 1 \\ 0 & -H \end{pmatrix}$. On vérifie qu'on peut simplifier le terme $R_A(-a)$ pour obtenir la résolution :

$$0 \rightarrow P \xrightarrow{t(\varphi, H\alpha)} N \oplus R_A(-a') \xrightarrow{(H\sigma, Q)} I_{\mathcal{C}_1}(a - a') \rightarrow 0.$$

La conclusion résulte alors du cas $a = a'$ appliqué à $\mathcal{C}'$ et $\mathcal{C}_1$.

Nous abordons maintenant le cas $\overline{Q} = 0$.

Lemme 3.8. *Soit $\mathcal{C}$ une famille de courbes avec une résolution de la forme :*

$$0 \rightarrow P \xrightarrow{t(\varphi, \alpha)} N \oplus R_A(-a) \xrightarrow{(\sigma, Q)} I_{\mathcal{C}} \rightarrow 0.$$

On suppose qu'on a $\overline{Q} = 0$.

Il existe $b \in \mathbf{N}$ tel que, pour (s, H, H', β) général dans $N_b \times R_{A, b-a}^2 \times \text{Hom}_{R_A}(P, R_A(-a))$, les conditions suivantes sont réalisées :

- (i) *les images de $\det \begin{pmatrix} \varphi & s \\ \alpha & H \end{pmatrix}$ et $\det \begin{pmatrix} \varphi & s \\ \beta & H' \end{pmatrix}$ dans R sont non nulles,*
- (ii) *$\overline{H'}$ et $\overline{\sigma(s) + QH}$ sont sans facteur commun,*
- (iii) *il existe une famille plate $\mathcal{C}'$ de courbes admettant la résolution :*

$$0 \rightarrow P \oplus R_A(-b) \xrightarrow{\psi} N \oplus R_A(-a)^2 \rightarrow I_{\mathcal{C}'}(b - a) \rightarrow 0$$

avec $\psi = \begin{pmatrix} \varphi & s \\ \alpha & H \\ \beta & H' \end{pmatrix}$ et on passe de $\mathcal{C}$ à $\mathcal{C}'$ par un nombre fini de biliaisons élémentaires.

Démonstration. Chaque condition étant “ouverte modulo m_A ” (pour (i) et (ii) c'est immédiat, pour (iii), cf. par exemple [MDP1] II 1.2), il suffit de vérifier séparément qu'elle est non vide.

Soient C la fibre de $\mathcal{C}$ au-dessus du point fermé et $\mathcal{N}$ le faisceau associé à N . Remarquons d'abord que l'homomorphisme $\overline{\mathcal{N}} \rightarrow \mathcal{J}_C$ induit par σ n'est pas nul puisque C est une courbe. En vertu du théorème de changement de base il existe $b > a$ tel que $H^0 \mathcal{N}(b) = N_b$, que l'homomorphisme $H^0 \mathcal{N}(b) \rightarrow H^0 \overline{\mathcal{N}}(b)$ soit surjectif et que $H^0 \overline{\mathcal{N}}(b) \rightarrow H^0 \mathcal{J}_C(b)$ soit non nul, donc il existe $s \in N_b$ tel que $\overline{\sigma}(\overline{s}) \neq 0$. Le déterminant de $\begin{pmatrix} \varphi & s \\ \alpha & H \end{pmatrix}$ est égal à $\sigma(s) + QH = F$ et n'est pas nul dans R puisque $\overline{Q} = 0$. En prenant aussi $\beta = \alpha$ et $H' = H$, on voit que la condition (i) n'est pas vide.

Soient s et H vérifiant (i). On choisit H' dans $R_{A,b-a}$ tel que $\overline{F}$ et $\overline{H}'$ soient sans facteur commun (cf. 3.6) ce qui donne (ii) et on fait avec H' une biliaison élémentaire triviale de hauteur $b - a$ sur la famille de surfaces définie par F . Le lemme 3.6 donne une courbe $\mathcal{C}'_1$ admettant la résolution annoncée en (iii) avec $\beta = 0$. Pour β général on a encore une courbe $\mathcal{C}'$. En vertu de 3.7, comme $\det \begin{pmatrix} \varphi & s \\ \alpha & H \end{pmatrix}$ est non nul, on passe de $\mathcal{C}'_1$ à $\mathcal{C}'$ (donc aussi de $\mathcal{C}$ à $\mathcal{C}'$) par un nombre fini de biliaisons élémentaires.

Nous pouvons maintenant prouver 3.5 dans le cas $L = L' = R_A(-a)$.

Lemme 3.9. *Soient $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ deux familles de courbes avec des résolutions de la forme :*

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow P \xrightarrow{t(\varphi \ \alpha)} N \oplus R_A(-a) \xrightarrow{(\sigma \ Q)} I_{\mathcal{C}} \rightarrow 0 \\ 0 \rightarrow P \xrightarrow{t(\varphi \ \alpha')} N \oplus R_A(-a) \xrightarrow{(\sigma' \ Q)} I_{\mathcal{C}'} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Alors on passe de $\mathcal{C}$ à $\mathcal{C}'$ par un nombre fini de biliaisons élémentaires.

Démonstration. Si $\overline{Q}$ est non nul on applique 3.7. Sinon, il existe $b \in \mathbf{N}$ et (s, H, H', β) dans $N_b \times R_{A,b-a}^2 \times \text{Hom}_{R_A}(P, R_A(-a))$ qui vérifient les conditions du lemme 3.8 pour $\mathcal{C}$ et pour $\mathcal{C}'$.

Soit ψ (resp. ψ') : $P \oplus R_A(-b) \rightarrow N \oplus R_A(-a)^2$ donné par la matrice

$$\begin{pmatrix} \varphi & s \\ \alpha & H \\ \beta & H' \end{pmatrix} \quad (\text{resp.} \quad \begin{pmatrix} \varphi & s \\ \alpha' & H \\ \beta & H' \end{pmatrix}).$$

Alors ψ (resp. ψ') définit une famille de courbes $\mathcal{C}_1$ (resp. $\mathcal{C}'_1$). Puisque le déterminant de $\begin{pmatrix} \varphi & s \\ \beta & H' \end{pmatrix}$ n'est pas nul dans R , on passe de $\mathcal{C}_1$ à $\mathcal{C}'_1$ par une biliaison élémentaire en vertu de 3.7. Mais, d'après 3.8, on passe aussi de $\mathcal{C}$ à $\mathcal{C}_1$ (resp. de $\mathcal{C}'$ à $\mathcal{C}'_1$) par une biliaison élémentaire, d'où le résultat.

Il ne reste plus qu'à terminer la démonstration de 3.5.

On pose $L = R_A(-a_1) \oplus \cdots R_A(-a_r)$ et $L' = R_A(-b_1) \oplus \cdots R_A(-b_r)$ avec $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_r$ et $b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_r$ et on peut supposer $a_r \leq b_r$. Soient $Q'_1, \dots, Q'_r$ les images

des $R_A(-b_j)$ dans $I_{\mathcal{C}'}(h')$. On raisonne par récurrence sur r . Le cas $r = 0$ est évident. Supposons l'assertion établie pour $r - 1$.

1) *Premier cas* : On suppose qu'il existe i, j tels que $a_i = b_j$.

Soient α_i et α'_j les lignes d'indice i, j dans α et α' . Il existe un homomorphisme $w : P \rightarrow R_A(-a_i) = R_A(-b_j)$ tel que si on remplace α_i (resp. α'_j) par w dans α (resp. α') le conoyau du morphisme est encore l'idéal tordu d'une famille de courbes Γ (resp. Γ'). En effet l'ensemble des w convenables est un ouvert non vide de $\text{Hom}(P, R_A(-a_i)) \otimes_A k$. Alors, le lemme 3.9 montre que $\mathcal{C}$ et Γ (resp. $\mathcal{C}'$ et Γ') sont dans la même classe de biliaison et l'hypothèse de récurrence montre qu'il en est de même de Γ et Γ' , ce qui permet de conclure.

2) *Deuxième cas* : On suppose $a_r < b_r$ et l'un des $\overline{Q'_j}$ non nul.

Comme on a $b_j \leq b_r$, quitte à faire un changement de base dans L' (ce qui ne change pas φ), on peut supposer $\overline{Q'_r}$ non nul.

On effectue une biliaison élémentaire triviale sur la surface (plate) définie par Q'_r , de hauteur $b_r - a_r$ et on obtient une courbe $\mathcal{C}''$. En utilisant 3.6 et un raisonnement de simplification comme celui utilisé dans la preuve de 3.7, on voit que $\mathcal{C}''$ a une résolution de la même forme que $\mathcal{C}'$, avec le même φ , mais où b_r est remplacé par a_r et on est ramené au premier cas (attention a_r n'est plus nécessairement le plus grand des b_j).

3) *Troisième cas* : On suppose $a_r < b_r$ et les $\overline{Q'_j}$ tous nuls.

Soient $\overline{\mathcal{C}}$ et $\overline{\mathcal{C}'}$ les fibres fermées des familles $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$. On a la suite exacte $\overline{\mathcal{P}} \xrightarrow{\overline{\varphi}} \overline{\mathcal{N}} \rightarrow \mathcal{J}_{\overline{\mathcal{C}'}}(h') \rightarrow 0$ et, avec la résolution de $\mathcal{J}_{\overline{\mathcal{C}}}(h)$ on en déduit qu'on a une surjection $\mathcal{J}_{\overline{\mathcal{C}}}(h) \rightarrow \mathcal{J}_{\overline{\mathcal{C}'}}(h')$ ce qui n'est possible que si $\overline{\mathcal{C}} = \overline{\mathcal{C}'}$ et $h = h'$. Mais alors, si on regarde les résolutions de $\overline{\mathcal{C}}$ et $\overline{\mathcal{C}'}$ obtenues par réduction modulo m_A , l'égalité des cohomologies de $\overline{\mathcal{C}}$ et $\overline{\mathcal{C}'}$ montre l'égalité des a_i et b_i , ce qui est absurde.

Remarque 3.10. La preuve de la condition nécessaire est encore valide lorsque le corps résiduel $k(t)$ de A est fini. En revanche pour la condition suffisante, les assertions d'existence de la preuve de 3.4 utilisent l'hypothèse que $k(t)$ est infini. Si $k(t)$ est fini, la conclusion de 3.4 est vraie sur un anneau B local fini et étale sur A .

e) *Liaison impaire.*

Les résultats précédents permettent aussi de donner un théorème dans le cas de la liaison impaire :

Théorème 3.11. *On suppose A local. Soient $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ deux familles plates de courbes paramétrées par A , munies de résolutions de type N (resp. E), avec des faisceaux $\mathcal{N}, \mathcal{N}'$ (resp. $\mathcal{E}, \mathcal{E}'$). Alors, $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ sont liées par un nombre impair de liaisons élémentaires si et seulement si $\mathcal{N}$ et $\mathcal{E}'^\vee$ sont pseudo-isomorphes à décalage près ou encore si et seulement si $\mathcal{N}'$ et $\mathcal{E}^\vee$ sont pseudo-isomorphes à décalage près.*

Démonstration. Supposons d'abord $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ reliées par une chaîne de courbes $\mathcal{C}_0 = \mathcal{C}, \mathcal{C}_1, \dots, \mathcal{C}_{2n}, \mathcal{C}_{2n+1} = \mathcal{C}'$, dans laquelle on passe de $\mathcal{C}_i$ à $\mathcal{C}_{i+1}$ par une liaison élémentaire. Alors, on sait (cf. 2.24) que $\mathcal{C}_{2n}$ admet une résolution de type E dont le faisceau $\mathcal{E}_{2n}$ est $\mathcal{N}'^\vee(-s - t)$. Comme $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}_{2n}$ sont biliées en vertu de 1.8, il résulte de 3.2 que $\mathcal{E}^\vee$ et

$\mathcal{N}'(-s-t)$ sont pseudo-isomorphes à décalage près. Pour l'autre assertion on applique 2.24 à $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}_1$.

Supposons maintenant, par exemple, $\mathcal{N}$ et $\mathcal{E}^\vee$ sont pseudo-isomorphes à décalage près. On fait une liaison qui passe de $\mathcal{C}$ à $\mathcal{C}_1$ (cf. 1.4). Alors, $\mathcal{C}_1$ a une résolution de type E avec pour $\mathcal{E}_1$ un décalé de $\mathcal{N}^\vee$ (cf. 2.24) et donc $\mathcal{N}$ pseudo-isomorphe à $\mathcal{E}'^\vee$ (cf. 2.3). Il résulte alors de 3.2 que $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}'$ sont biliées, donc que l'on passe de l'une à l'autre par un nombre pair de liaisons élémentaires (cf. 1.8), donc de $\mathcal{C}$ à $\mathcal{C}'$ par un nombre impair de liaisons élémentaires.

f) Cas de la dimension quelconque.

La définition des pseudo-isomorphismes se généralise comme suit dans le cas de la dimension $n \geq 3$:

Définition 3.12. Soient $\mathcal{N}$ et $\mathcal{N}'$ des faisceaux cohérents sur $\mathbf{P}_A^n$ et plats sur A et soit f un morphisme de $\mathcal{N}$ dans $\mathcal{N}'$. On dit que f est un pseudo-isomorphisme s'il induit :

- 0) un isomorphisme de foncteurs $H^0(\mathcal{N}(n) \otimes_A \cdot) \rightarrow H^0(\mathcal{N}'(n) \otimes_A \cdot)$ pour tout $n \ll 0$,
- 1) un isomorphisme de foncteurs $H_*^i(\mathcal{N} \otimes_A \cdot) \rightarrow H_*^i(\mathcal{N}' \otimes_A \cdot)$ pour $1 \leq i \leq n-2$ et
- 2) un monomorphisme de foncteurs $H_*^{n-1}(\mathcal{N} \otimes_A \cdot) \rightarrow H_*^{n-1}(\mathcal{N}' \otimes_A \cdot)$.

Deux faisceaux cohérents sur $\mathbf{P}_A^n$ et plats sur A seront dits pseudo-isomorphes s'il existe une chaîne de *psi* qui les joint :

$$\mathcal{N} = \mathcal{N}_0 \rightarrow \mathcal{N}_1 \leftarrow \mathcal{N}_2 \rightarrow \mathcal{N}_3 \leftarrow \cdots \rightarrow \mathcal{N}_{2p-1} \leftarrow \mathcal{N}_{2p} = \mathcal{N}'.$$

On généralise sans difficulté l'ensemble des définitions et des résultats ci-dessus et on obtient le théorème suivant :

Théorème 3.13. Soient $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ deux familles plates de sous-schémas de $\mathbf{P}^n$ ($n \geq 3$), de pure codimension 2, sans composantes immergées, paramétrées par l'anneau local A , munies de résolutions de type N (resp. E), avec des faisceaux $\mathcal{N}$, $\mathcal{N}'$ (resp. $\mathcal{E}$, $\mathcal{E}'$). Alors, $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ sont dans la même classe de biliaison si et seulement si $\mathcal{N}$ et $\mathcal{N}'$ sont pseudo-isomorphes, à décalage près (resp. si $\mathcal{E}^\vee$ et $\mathcal{E}'^\vee$ sont pseudo-isomorphes, à décalage près).

Références bibliographiques.

[AG] Hartshorne R., Algebraic geometry, Graduate texts in Mathematics 52, Springer Verlag, 1977.

[BPS] Bănică C., Putinar M., Schumacher G., Variation der globalen Ext in Deformationen kompakter komplexer Räume, Math. Ann. 250, 1980, 135-155.

[EGA] Grothendieck A. et Dieudonné J., Éléments de géométrie algébrique, Publ. math. IHES, 1960-1967.

[H] Hartshorne R., Coherent functors, à paraître, Advances in Math.

[HMDP2] Hartshorne R., Martin-Deschamps M. et Perrin D., Construction de familles minimales de courbes gauches, en préparation.

- [HMDP3] Hartshorne R., Martin-Deschamps M. et Perrin D., Triades et familles de courbes gauches, en préparation.
- [Ho] Horrocks G., Vector bundles on the punctured spectrum of a local ring, Proc. London Math. Soc. (3) 14, 1964, 689-713.
- [JS] de Jong T., van Straten D., Deformations of the normalization of hypersurfaces (Appendix), Math. Ann. 288, 1990, 527-547.
- [K] Kleppe J.-O., Liaison of families of subschemes in $\mathbf{P}^n$ in Algebraic curves and projective geometry, (128-173), Proc. Trento, 1988, Lecture Notes in Math. 1389, Springer Verlag.
- [MDP1] Martin-Deschamps M. et Perrin D., Sur la classification des courbes gauches, Astérisque, Vol. 184-185, 1990.
- [Mi] Migliore J., An introduction to deficiency modules and liaison theory for subschemes of projective space, Lecture notes series of research institute of math., Seoul National University, 1994.
- [N] Nollet S., Even linkage classes, Trans. Amer. Math. Soc., 348-3, 1996, 1137-1162.
- [PS] Peskine C. et Szpiro L., Liaison des variétés algébriques, Invent. Math., 26, 1974, 271-302.
- [R1] Rao A.P., Liaison among curves in $\mathbf{P}^3$, Invent. Math., 50, 1979, 205-217.
- [R2] Rao A.P., Liaison equivalence classes, Math. Ann. 258, 1981, 169-173.
- [S] Schlesinger E., Ext and base change, unpublished manuscript, Berkeley, 1993.
- [V] Verdier J.-L., Catégories dérivées, état 0, *in* SGA 4 $\frac{1}{2}$, Lecture Notes in Math. 569, Springer Verlag, 1977.